

سرطان لوزالمعده (پانکراس):

در سال ۲۰۱۷، حدود ۵۳۶۷۰ آمریکایی با سرطان پانکراس تشخیص داده شدند. سرطان پانکراس در مردان نسبت به زنان شایعتر است و معمولاً بعد از ۴۵ سالگی رخ می‌دهد.

انواع سرطان لوزالمعده (پانکراس):

سرطان پانکراس بر اساس اینکه کدام قسمت از لوزالمعده را تحت تأثیر قرار داده است دسته بندی می‌شود: بخشی که تولید آنزیم های هضم‌کننده (برون ریز: اگزوکراین) را تولید می‌کند و بخشی که انسولین و هورمون‌های دیگر (درون ریز: اندوکراین) را تولید می‌کند.

سرطان پانکراس برون ریز Exocrine:

اگرچه چندین نوع سرطان لوزالمعده اگزوکراین وجود دارد، ۹۵٪ موارد به علت آدنوکارسینوم پانکراس است.

سرطان پانکراس درون ریز Endocrine:

سایر سلول‌های پانکراس، هورمون‌هایی را می‌سازند که بطور مستقیم در جریان خون آزاد می‌شوند (سیستم غدد درون‌ریز). تومورهای سرطانی ناشی از این سلول‌ها تومورهای نورواندوکراین پانکراس یا تومورهای سلول جزایری کوچک هستند.

علائم سرطان لوزالمعده

(پانکراس): سرطان پانکراس اغلب تا زمانی که پیشرفته کرده و درمان آن دشوار می‌شود، ناشناخته می‌ماند. در اکثر موارد، علائم تنها پس از اینکه سرطان پانکراس رشد کرده و گسترش می‌یابد، ظاهر می‌شوند.

از آنجایی که بیش از ۹۵٪ سرطان لوزالمعده از نوع برون ریز (اگزوکراین) است، ابتدا این علائم را توصیف می‌کنیم و سپس علائم انواع نادر سرطان پانکراس را توضیح می‌دهیم.

در ابتدا، سرطان لوزالمعده تمایل به رشد ساکت و بی‌درد دارد. سرطان پانکراس به مرور زمان رشد می‌کند و به اندازه کافی بزرگ می‌شود تا ایجاد علائم نماید. سرطان پانکراس بطور کلی به خارج پانکراس رشد می‌کند. بدلیل موقعیت پانکراس در بدن، علائم عبارتند از:

یرقان: زمانی که سرطان لوزالمعده محل اتصال مجرای صفراوی به روده (مجرای صفراوی مشترک) را مسدود میکند، مواد تشکیل‌دهنده صفرا در خون جمع می‌شود. این مواد پوست و چشم را زرد می‌کند، وضعیتی به نام زردی یا یرقان را ایجاد می‌کنند که باعث تیره شدن ادرار، روشن شدن رنگ مدفوع و خارش می‌شود.

درد شکم: سرطان لوزالمعده می‌تواند یک درد طاقت فرسا در قسمت فوقانی شکم به سمت پشت را ایجاد کند. درد ممکنست کم و زیاد شود.

کمردرد

آروغ زدن برخی از افراد مبتلابه

سرطان لوزالمعده ممکنست احساس سبزی زودرس با وعده‌های غذایی یا تورم ناخوشایند در شکم داشته باشند.

تهوع

استفراغ

بروز علائم به موقعیت تومور بستگی دارد. بطور کلی، علائم سرطان سر پانکراس در مقایسه با تنه و انتهای پانکراس زودتر ظاهر می‌شود. در نظر داشته باشید که داشتن هر یک از این علائم یا همه این علائم به این معنی نیست که فرد مبتلابه سرطان پانکراس باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس

بیمارستان آنکولوژی امیر

سرطان لوزالمعده



ساناز عبدالرضاپور

سوپروایزر آموزش سلامت

تایید کننده: طوبی کوشکی

مدیر پرستاری

بهمن ماه ۱۴۰۲

منبع: WebMD 2017 American Cancer Society
2018

www.cnin.ir

سونوگرافی آندوسکوپی
کلانژوپانکراتوگرافی رتروگرید با
اندوسکوپی (ERCP)

درمان سرطان لوزالمعده (پانکراس):

چه پزشکی، "سرطان لوزالمعده (پانکراس)" را
درمان می کنند؟

بسته به مرحله سرطان لوزالمعده (گسترده‌گی، مکان
و شدت)، ممکنست چندین پزشک متخصص با
همانگی یکدیگر، در یک تیم درمانی، به تصمیم
گیری برای انتخاب گزینه های درمانی مشغول
باشند. مثلاً:

- **متخصص جراحی عمومی:** پزشک
متخصص درمان بیماریهای دستگاه گوارش با
جراحی.

- **فلوشیپ جراحی سرطان:** پزشک
متخصص جراحی عمومی که دوره تکمیلی
(فلوشیپ) جراحی سرطان را طی کرده و سرطان
های لوزالمعده را با جراحی و درآوردن بافت
سرطانی درمان می کند.

- **فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و
هماتولوژی:** پزشک فوق تخصص درمان سرطان
با داروهای شیمی درمانی، تارگت تراپی و
ایمونوتراپی و پیوند مغز استخوان، که کل برنامه
درمان را طرح ریزی می کند.

- **فوق تخصص گوارش:** پزشک فوق
تخصص تشخیص بیماریهای دستگاه گوارش و
درمان آن بیماریها با دارو.

علامه مشاهده شده سرطان پانکراس در کل بدن:

همانطور که سرطان رشد و گسترش
می یابد، سرطان پانکراس بر کل بدن تأثیر
می گذارد و می تواند این علائم را به همراه
داشته باشد:

- کاهش وزن
- کسالت
- از دست دادن اشتها
- افزایش قند خون

بعضی افراد مبتلا به سرطان پانکراس بعلت
اینکه سرطان موجب کاهش تولید انسولین
پانکراس می شود موجب دیابت می شود
(بالینحال اکثریت قریب به اتفاق افراد مبتلا
به دیابت سرطان پانکراس ندارند).

تشخیص سرطان لوزالمعده (پانکراس):

علاوه بر شرح حال و معاینه، برای کمک
به تشخیص سرطان پانکراس
تصویربرداری هایی نیز انجام خواهد شد که
عبارتند از:

- سونوگرافی
- CT اسکن
- MRI