

## علایم اولیه هشدار

## MEWS

(Modified early warning scoring)

۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳	پارامتر فیزیولوژیک
بیشتر از ۱۳۰	۱۳۰-۱۱۱	۱۱۰-۹۱	۹۰-۶۱	۶۰-۴۱	کمتر از ۴۰		تعداد ضربان قلب در دقیقه
بیشتر از ۲۰۰	۱۹۹-۱۷۰	۱۶۹-۱۴۰	۱۳۹-۱۰۱	۱۰۰-۸۱	۷۱-۸۰	کمتر از ۷۰	فشار خون سیستولیک (میلی متر جیوه)
بیشتر از ۳۰	۲۹-۲۱	۲۰-۱۵	۱۴-۹		کمتر از ۸		تعداد تنفس در دقیقه
					کمتر از ۹۰٪	کمتر از ۸۵٪	میزان اشباع اکسیژن خون شریان (درصد)
		۳۷/۵	۳۶/۶-۳۷/۴	۳۵/۱-۳۶/۵	کمتر از ۳۵		دمای بدن
عدم هوشیاری	واکنش به تحریک دردناک	واکنش به صدا زدن	هوشیار		گیج confused		سطح هوشیاری (AVPU)
				کمتر از 45mls/hr	کمتر از 30mls/hr	کمتر از 10mls/hr	دفع ادراری به مدت ۲ ساعت
تهیه و تنظیم: دکتر امیر سعید (فلو شیپ مراقبتهای ویژه کودکان) با همکاری مرضیه محبی (سوپروایزر آموزشی)				MEWS بالاتر از ۴ نیاز به هماهنگی جهت ICU و در نظر گرفتن اقدامات حیاتی است.			
EDU-C-001/09							

